

Preparazione valida per l'Istituto Clinico Humanitas Rozzano

(per Humanitas San Pio X consultare la preparazione presente a pagina 4)

Dipartimento di Diagnostica per Immagini

NORME DI PREPARAZIONE PER GLI ESAMI

1. TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA CON MEZZO DI CONTRASTO (TAC)
2. FLEBOGRAFIA

Il paziente è invitato ad attenersi scrupolosamente alle norme riportate.

Il giorno dell'esame TAC presentarsi a **digiuno da almeno 8 ore** e **portare** in visione i **risultati** dei seguenti esami, **eseguiti da non più di un mese**:

- Glicemia
- AST
- ALT
- IGM
- Rapporto Kappa/Lambda (in alternativa elettroforesi delle proteine)
- Creatinina

Portare con sé gli esami radiologici precedenti.

Il giorno dell'esame è necessario portare con sé la **prescrizione medica** (rossa, dematerializzata o su carta intestata) **e una fotocopia** della stessa da presentare al personale sanitario. La prescrizione medica deve riportare l'esame richiesto e il quesito diagnostico.

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO PER ALLERGIA A MEZZO DI CONTRASTO

In relazione alla Sua anamnesi positiva per reazione avversa a MdC, Le suggeriamo di sottoporsi al seguente schema di premedicazione da condividere con il Suo Medico di Medicina Generale*:

- 1) Prednisone 50 mg/os (Deltacortene forte 25 mg 2cp)
13 ore prima, 7 ore prima e 1 ora prima dell'esecuzione dell'esame;
- 2) Omeprazolo 20mg (Omeprazolo 20 mg 1 cp)
Da assumere 10 minuti prima della terapia cortisonica (13 ore prima, 7 ore prima, e un'ora prima dell'esame);
- 3) Antistaminico [Es.Cetirizina (Zirtec 1cp) OPPURE Desclorfeniramina (Polaramin 1 cp)]
1 ora prima dell'esecuzione dell'esame.

*Linee Guida SIRM-SIAAIC

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO PER ALLERGIA A MEZZO DI CONTRASTO

In pazienti con angioedema ricorrente, mastocitosi o anafilassi idiopatica

In relazione alla Sua anamnesi, Le suggeriamo di sottoporsi al seguente schema di premedicazione da condividere con il Suo Medico di Medicina Generale*:

- 1) Prednisone 50 mg/os (Deltacortene forte 25 mg 2cp)**
12 ore prima e 2 ore prima dell'esecuzione dell'esame;
- 2) Omeprazolo 20mg (Omeprazolo 20 mg 1 cp)**
Da assumere 10 minuti prima della terapia cortisonica (12 ore prima e 2 ore prima dell'esecuzione dell'esame);
- 3) Antistaminico [Es.Cetirizina (Zirtec 1cp) OPPURE Desclorfeniramina (Polaramin 1 cp)]**
1 ora prima dell'esecuzione dell'esame;
- 4) Montelukast (Montegen 10mg 1 cp OPPURE Singulair 10mg 1 cp)**
Ogni sera a partire da 10 giorni prima dell'esecuzione dell'esame.

*Linee guida SIRM-SIAAIC

Preparazione valida per Humanitas San Pio X

(per l'Istituto Clinico Humanitas Rozzano consultare la preparazione presente a pagina 1)

NORME DI PREPARAZIONE

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA CON MEZZO DI CONTRASTO (TAC)

Il giorno fissato per l'esame presentarsi con:

- Gli esiti dei seguenti esami del sangue: **Creatininemia** e **Azotemia** non anteriore ai 60 giorni
- Digiuno non inferiore alle 6 (sei) ore.
- **Documentazione clinica** (visite specialistiche, descrizione di interventi chirurgici, lettere di dimissione ospedaliera, ...) e **Radiologica** (radiografie, ecografie, tomografie computerizzate o Risonanza Magnetica) relative alla problematica in esame.
- **Tessera sanitaria.**
- **Richiesta del Medico** (*con quesito clinico*).

ATTENZIONE

In caso di **terapia medica** o **farmaci salvavita** la terapia **non deve essere sospesa**

- Se è in trattamento con **Metformina**:
 - Il **farmaco** deve essere **sospeso due giorni** prima dell'esame e **due giorni** dopo l'esame
- Se ha avuto precedenti **reazioni a mezzo di contrasto iodato** o a **farmaci** (eritema generalizzato, orticaria/angioedema, broncospasmo, ipotensione, anafilassi, reazioni cutanee ritardate):
 - eseguire **visita allergologica** prima di sottoporsi all'esame
- Se è affetto da **asma bronchiale sintomatico**, **orticaria in atto** è preferibile rinviare l'esame fino a stabilizzazione del quadro clinico.
- Se è affetto da **Angioedema ricorrente**, **Mastocitosi**, **Anafilassi Idiopatica**
 - dovrà recarsi dal suo Medico di Medicina Generale per farsi prescrivere:
 - ✚ **Prednisone 50 mg** (1 cp 12 e 2 ore prima dell'esame)
 - ✚ **Cetirizina 10 mg + Montelukast 10 mg** (1 cp 1 ora prima dell'esame)

HUMANITAS

➤ Se ha una **funzionalità renale ridotta** (Creatinina alta – *al di fuori del range di riferimento del Laboratorio presso cui è stato eseguito l'esame*):

• dovrà recarsi dal suo Medico di Medicina Generale per farsi prescrivere:

✚ **Acetilcisteina** (esempio: Flumucil, 2 cps da 600 mg x 2/die il giorno prima ed il giorno dell'esame)

✚ **richiesta** per l'esecuzione della **Creatininemia** da eseguire il giorno stesso dell'esame.

- **Sospendere** la terapia diuretica **il giorno prima** dell'esame **e il giorno stesso dell'esame**.
- **Il giorno dell'esame** dovrà presentarsi **in Radiologia 1 ora prima dell'esame per completare la preparazione**.

In caso di terapia medica o farmaci salvavita la terapia non deve essere sospesa

ATTENZIONE

Si prega cortesemente di segnalare appena possibile eventuali impedimenti che rendessero impossibile l'esecuzione telefonando al numero 02 6951 7801

Dipartimento di Diagnostica per Immagini

NORME DI PREPARAZIONE

UROTAC

Per il medico di medicina generale

Oggetto: esecuzione Urotac

Gentile Collega,

Con la presente desideriamo informarti sulle modalità prescrittive in regime di Servizio Sanitario Nazionale dell'esame di cui in oggetto.

La **Urotac**, consente di ricostruire le vie urinarie al termine della tac dell'addome con contrasto, avendone una valutazione simil-urografica. L'esame consente una valutazione sia del parenchima renale che delle vie escrettrici unendo i vantaggi diagnostici della TC (panoramicità) con i rilievi propri della urografia.

L'indagine ha quindi valenza sia morfologica che funzionale.

Le principali indicazioni possono essere costituite dalla ematuria e dallo studio della patologia litiasica e neoplastica (in particolare vescicale).

La modalità prescrittiva prevede che sulla stessa impegnativa siano riportate le tre prestazioni seguenti:

88.01.6	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO +
8819	RADIOGRAFIA DELL'ADDOME

Dipartimento di Diagnostica per Immagini

Per il paziente

Portare con sé l'esito dei seguenti esami del sangue:

- AST - ALT
- glicemia
- creatinina
- IgM
- rapporto kappa/lambda (o, in alternativa, elettroforesi delle proteine)

È consentita l'assunzione di farmaci nelle terapie croniche.

Presentarsi a **digiuno da almeno 8 ore** dall'orario di esecuzione dell'esame.

Portare con sé gli esami radiologici precedenti.

Il giorno dell'esame è necessario portare con sé la **prescrizione medica** (rossa, dematerializzata o su carta intestata) **e una fotocopia** della stessa da presentare al personale sanitario. La prescrizione medica deve riportare l'esame richiesto e il quesito diagnostico.